

FUNGOWAS SOLUCIÓN DERMATOLÓGICA

Ciclopirox olamina

COMPOSICIÓN

Ciclopirox olamina 1 g y Excipientes (Propilenglicol y Parahidroxibenzoato de metilo) c.s.p. 100 ml.

PROPIEDADES

La Ciclopirox olamina es un agente con un amplio espectro antifúngico que inhibe el crecimiento de dermatofitos y levaduras patógenos. La ciclopirox olamina presenta actividad fungicida in vitro frente a *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum canis* y *Candida albicans*, entre otros géneros de hongos. La ciclopirox olamina se caracteriza además por poseer poder de penetración en los epitelios y en el estrato córneo.

INDICACIONES

Tratamiento de dermatomicosis por dermatofitos: *Tinea pedis*, *Tinea corporis*; Candidiasis, Ptiiriasis versicolor, Balanitis y como tratamiento complementario de la pareja con infección ginecológica.

POSOLOGÍA

La aplicación de la solución se realizará, salvo distinto criterio facultativo, dos veces al día (una por la mañana y otra por la noche), en la zona afectada de la piel o uñas, con un suave masaje. La aplicación debe prolongarse hasta transcurridas una o dos semanas de la desaparición de los síntomas de la infección para evitar recaídas y producción de resistencias. Suele ocurrir una mejoría clínica dentro de la primera semana de tratamiento. Si el paciente no muestra mejoría después de cuatro semanas de su aplicación, el diagnóstico debe ser revisado. Los pacientes con tiña versicolor normalmente presentan una curación clínica, con eliminación del hongo, después de dos semanas de tratamiento.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la ciclopirox olamina o a alguno de los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES

No aplicar en los ojos.

Embarazo: No se ha demostrado su inocuidad durante el mismo, por lo que no se recomienda su uso más que en aquellos casos en los que previamente la valoración riesgo-beneficio aconseje su utilización.

Lactancia: Se desconoce si el fármaco se elimina por la leche; su administración a madres lactantes se hará con precaución. No existen estudios de su utilización en niños de edad inferior a diez años.

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

EFECTOS SECUNDARIOS

Son más frecuentes en los primeros días de tratamiento. Puede aparecer escozor, enrojecimiento y sensación de calor en la piel. Estos efectos secundarios raramente conducen a la suspensión del tratamiento.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

No se prevé la aparición de intoxicaciones. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, tel. 91 562 04 20, y aplicar tratamiento sintomático.

PRESENTACIONES

FUNGOWAS Crema Dermatológica. Tubo con 30 g.

FUNGOWAS Solución Dermatológica. Frasco con 30 ml.

FUNGOWAS Crema Ginecológica. Tubo con 40 g y 6 aplicadores.

CON RECETA MÉDICA**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.es>.

CHIESI ESPAÑA, S.A.

Plaça d'Europa, 41-43, Planta 10
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona (España)